

Cleft Lip Repair

Post Operative Instructions



Children's
of Alabama®

UAB MEDICINE

1600 7th Avenue South • Birmingham, Alabama 35233 • 205.638.9100

What to Expect

- Expect your baby to have skin glue or steri-strips covering the dissolvable sutures.

Activity and Care

- Feed your baby with the usual bottle.
- **No** pacifiers for 6 weeks after repair.
- Continue using arm splints for 2 weeks after surgery to make sure they don't accidentally hurt their lip. You may remove the splints if you are holding your baby in your arms or are otherwise **watching them closely**.
- You may bathe your baby as usual.
- Your child may return to daycare in 2 weeks when arm splints are no longer required.

Lip Care

- Your baby may have a nasal stent. If a stent is present, it will be removed 1 week after surgery. If there is no stent, it was not necessary.
 - **Dr. Myers' patients:**
 - Skin glue is used over the sutures.
 - The glue generally falls off 4-5 days after surgery.
 - If the glue is still present after 5 days, it can be removed by putting Vaseline on it followed by washing it off.
 - **Dr. Svientek's patients:**
 - Steri-strips are used over the sutures.
 - Please allow the strips to come off on their own. If they are still present, we will remove them at the post-operative appointment.

Diet

- Your baby should resume the same formula and amounts they were taking before surgery. This may take a few days.

Medication

- Children's Tylenol®(acetaminophen) may be given for discomfort. Check the package for dosage and frequency.
- Ibuprofen may be given to patients **over 6 months of age**. See package for dosage and frequency.
- If your child was given a prescription for pain medication, please give **only** as directed. Often babies do very well, and do not need prescription pain medication. You will be the best judge of this.
- If you were given a prescription for antibiotics, please give as directed.

Follow-up appointments

- Call (205) 638-9369 to make a post-op appointment. If you are concerned, please call the office during regular business hours and we will schedule an appointment sooner.

When to Call Your Doctor

- Temperature greater than 101.5° F

For Questions or Concerns

- Call the Plastic Surgery office at (205) 638-9369 Monday-Friday 8:00am-4:00pm.
- After hours, call the hospital operator at (205) 638-9100 and ask for the Plastic Surgery fellow on call.
- **For emergencies, call 911.**

Reparación de labio hendido

Instrucciones después de la operación



Children's
of Alabama®

UAB MEDICINE

1600 7th Avenue South • Birmingham, Alabama 35233 • 205.638.9100

Qué esperar

- Espere que su bebé tenga un adhesivo en la piel o tiras adhesivas que cubran las suturas solubles.

Actividad y atención

- Alimente a su bebé con el biberón habitual.
- **No** use chupetes durante 6 semanas después de la reparación.
- Siga usando férulas en los brazos durante 2 semanas después de la operación para asegurarse de que no lastime accidentalmente su labio. Puede sacar las férulas si sostiene al bebé en sus brazos o lo vigila **de cerca de otra manera**.
- Puede bañar a su bebé como de costumbre.
- Su hijo puede regresar a la guardería en 2 semanas cuando las férulas en los brazos ya no se necesiten.

Atención del labio

- Su bebé puede tener una endoprótesis nasal. Si hay una endoprótesis, se sacará 1 semana después de la operación. Si no hay ninguna endoprótesis, no es necesario.
 - **Pacientes del Dr. Myers:**
 - El adhesivo en la piel se usa sobre las suturas.
 - El adhesivo generalmente se desprende de 4-5 días después de la operación.
 - Si el adhesivo sigue pegado después de 5 días, puede sacarse echándole vaselina y luego lavándolo.
 - **Pacientes del Dr. Svientek:**
 - Las tiras adhesivas se usan sobre las suturas.
 - Deje que las tiras adhesivas se desprendan solas. Si siguen pegadas, las sacaremos en la cita posoperatoria.

Dieta

- Su bebé debe reanudar la misma fórmula y cantidades que estaba tomando antes de la operación. Esto puede tardar algunos días.

Medicamento

- Se puede administrar Children's Tylenol® (acetaminophen) para las molestias. Revise el envase para ver la dosis y la frecuencia.
- Se puede administrar Ibuprofen a pacientes **mayores de 6 meses**. Consulte el envase para ver la dosis y la frecuencia.
- Si le dieron a su hijo una receta para analgésicos, adminístrelos **solo** como le indiquen. A menudo les va muy bien a los bebés y no necesitan analgésicos con receta. Usted será el que evalúe mejor esto.
- Si le dieron una receta para antibióticos, adminístrelos como le indiquen.

Citas de seguimiento

- Llame al (205) 638-9369 para hacer una cita posoperatoria. Si está preocupado, llame al consultorio durante el horario de atención habitual y le programaremos una cita más pronto.

Cuándo llamar a su médico

- Temperatura de más de 101.5 °F

Si tiene preguntas o preocupaciones

- Llame al consultorio de Cirugía plástica al (205) 638-9369, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Después del horario de atención, llame al operador del hospital al (205) 638-9100 y pregunte por el residente de Cirugía plástica de guardia.
- **Para emergencias, llame al 911.**